

Схема за мониториране на чернодробната функция с Valdoxan

Valdoxan 25 mg

- Преди лечението с 25 mg
ALAT.....U/L
ASAT.....U/L
- Седмица 3
ALAT.....U/L
ASAT.....U/L
- Седмица 6
ALAT.....U/L
ASAT.....U/L
- Седмица 12
ALAT.....U/L
ASAT.....U/L
- Седмица 24
ALAT.....U/L
ASAT.....U/L

Моля, направете изследването по всяко време, ако е клинично оправдано.

В случай на повишаване на дозата на 50 mg, започнете отново схемата за мониториране.

- Начало на лечението с 50 mg
ALAT.....U/L
ASAT.....U/L
- Седмица 3
ALAT.....U/L
ASAT.....U/L
- Седмица 6
ALAT.....U/L
ASAT.....U/L
- Седмица 12
ALAT.....U/L
ASAT.....U/L
- Седмица 24
ALAT.....U/L
ASAT.....U/L

Моля, направете изследването по всяко време, ако е клинично оправдано.

Име на пациента:.....

Дата на започване на лечението:.....

Симптоми или признаци на възможна чернодробна дисфункция*

- Прекратете терапията
- Изследване на чернодробната функция (включително трансаминизи) трябва да бъде направено

ALAT и/или ASAT > 3 пъти над горната граница на нормата

Симптоми или признаци на възможна чернодробна дисфункция*

ALAT и/или ASAT > 3 пъти над горната граница на нормата

- Прекратете терапията
- Повтаряйте редовно изследванията на чернодробната функция, докато серумните трансаминизи се нормализират

Серумни трансаминизи (ALAT, ASAT)

ALAT и/или ASAT ≤ 3 пъти над горната граница на нормата

Без симптоми или признаци на чернодробно увреждане
Повторете изследванията за чернодробната функция в срок до 48 часа

Нормално

ALAT и/или ASAT ≤ 3 пъти над горната граница на нормата

* Следете внимателно за поява на симптоми или признаци на възможна чернодробна дисфункция

- Продължете терапията
- Следвайте графика във времето за мониториране на чернодробните изследвания

*Тъмна урина, светли изпражнения, пожълтяване на кожата/очите, болки в дясната горна част на корема, продължаваща новопоявила се и необяснена с друга причина умора